Barclay
CROP PROTECTION

Barclay chapo شاپو

Suspension concentrée contenant : 250g/l Propeconazole

معلق مركز يحتوي على : 250غ/لتر من البروبيكونازول

Fongicide systémique contre les maladies des céréales

مبيد فطري جهازي لمكافحة أمراض الحبوب

Homologation au maroc F06-1-031 رخصة البيع بالمغرب رقم

Numéro du lot: Voir emballage
Date de fabrication:Voir emballage

رقم التوزيع: أنظر العلبة
تاريخ الإنتاج: أنظر العلبة

Importateur et Distributeur Exclusif au Maroc : PHYTOBEHT Sarl
3 BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI
SIDI SLIMANE 14200 - MAROC
TEL: +212537501495 - FAX : +212537503434

المستورد و الموزع الوحيد بالمغرب : PHYTOBEHT Sarl
3 مكرر شارع المغرب العربي
14200 سيدي سليمان – المغرب
الهاتف : 212537501495+ / الفاكس : 212537503434+

Contenance : Voir emballage

Usages autorises:

Cultures	Maladies	Doses	DAR
Blés	Septoriose	0,7 L/ha	40 J

La substance active propiconazole a une action préventive et curative.

BARCLAY CHAPO est un fongicide systémique qui est véhiculé dans la plante par le xylème.

Appartenant au groupe des triazoles, le propiconazole a un mode d'action qui bloque la biosynthèse de l'ergostérol (déméthylation du carbone en position 14 de cette molécule), qui est un élément essentiel à l'édification de la paroi cellulaire des champignons.

L'absence anormale de la synthèse de ce stérol ralentit puis arrête la croissance cellulaire du champignon.

Mode d'emploi :

Bien agiter le bidon avant utilisation. Verser **BARCLAY CHAPO** dans la cuve remplie à moitié d'eau puis compléter avec la quantité d'eau nécessaire et maintenir l'agitation jusqu'à la fin de l'application.

Appliquer immédiatement après préparation de la bouillie.

Appliquer la dose de **BARCLAY CHAPO** recommandée dans 100 à 400 L d'eau par hectare (quantité d'eau en fonction de la densité du feuillage de la culture).

Recommandations :

Éviter l'application par jet porté. Ne pas appliquer sur feuillage humide ou en cas de précipitations imminentes.

Précautions :

Eviter de respirer le brouillard de pulvérisation, de boire, de manger et de fumer pendant l'application du produit.

Laver soigneusement à l'eau et au savon les parties du corps et les vêtements ayant été en contact avec le produit.

Le produit doit être enfermé dans un endroit frais, aéré et fermé à clé, loin des denrées alimentaires et des aliments pour bétail.

Centre anti-poison du Maroc:

Tél : 05 37 68 64 64 / N° Eco : 0801 000 180

مقادير الإستعمال :

الزراعات	الأمراض	الجرعة	مدة الأمان
القمح	سيبتوريوسيس	0.7 لتر/هكتار	40 يوم

المادة الفعالة البروبيكونازول لها قدرة علاجية ووقائية.

مبيد فطري جهازي ينقل الى النبتة بواسطة **XYLÉM**.

ينتمي إلى مجموعة التريازول،و البروبيكونازول لها طريقة عمل تمنع حيوية الإرغوستيرول (نزع الميتيل من الكربون 14 من الجزيئة) ، الذي هو عنصر أساسي في بناء جدار خلايا الفطريات.

الغياب غير طبيعي لمركب الستيرول يبطئ ويوقف نمو الخلايا الفطرية.

طريقة الإستعمال :

يجب تحريك العلبة قبل الإستعمال، ويجب وضع **باركلاي شاپو** في خزان آلة الرش مملؤة الى النصف بالماء بعد ذلك يتم ملأ الخزان بالكامل مع التحريك حتى النهاية.

الإستعمال مباشرة بعد إعداد الخليط.

تطبق الجرعة الموصى بهامن **باركلاي شاپو** من 100 إلى 400 لتر من الماء في الهكتار (كمية الماء إعتماداً على كثافة الأوراق في الزراعة).

توصيات :

تجنب الإستعمال عن طريق دفع الهواء ؛ لا يستعمل على الأوراق الرطبة أو في حالة وجود أو غياب المطر.

الإحتياطات :

تجنب استنشاق الهواء الممزوج بالدواء، تجنب الشرب ، الأكل والتدخين عند استعمال المنتوج .

اغسل جيدا بالماء والصابون أجزاء الجسم المكشوفة وملابس العمل.

يجب أن يحتفظ بالمنتوج في مكان بارد، مهوى ومغلق بعيداً عن الأطفال ،الأغدية وعلف المواشي.

المركز المغربي لمحاربة التسمم :

الهاتف: 05 37 68 64 64 / الرقم الإقتصادي: 0 801 000 180